

Всем. Живем Шеняков 6

ОГБУЗ «Иркутская районная больница»
Хомутовский объект (клиника)

ФАКС NO. :

ДЕК. 18 2014 13:39 СТР1

Иркутская область, Иркутский район
с. Хомутово, ул. Тимирязева,
тел.: 696-343



**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Карла Маркса, 29, Иркутск, 664003
тел./факс (3952) 24-05-86.
e-mail: guzio@guzio.ru

№3434 от 16.10.14

ОГБУЗ «Иркутская областная
клиническая туберкулезная больница»
664039, г. Иркутск
ул. В. Терешковой, 59; а/я 7
тел.: 38-72-61

От 15.10.2014 № 54-35-11245/4
на № _____ от _____

О внедрении в работу санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»

При внедрении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» в работу медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, возникли вопросы по выполнению ряда положений указанного документа.

В связи с чем, министерство здравоохранения Иркутской области разъясняет:

1. По пункту 5.7. «Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания».

Дети, оформляющиеся в детскую организацию при отказе от постановки пробы Манту, направляются на осмотр в противотуберкулезный диспансер (кабинет) к специалисту в течение 6 дней с момента отказа, предварительно пройдя клинико-рентгенологическое обследование (анализ крови, анализ мочи, рентген органов грудной клетки) в медицинской организации по месту жительства.

Врач-фтизиатр обязан не позднее 1 месяца со дня обращения выдать заключение. При заключении об отсутствии заболевания ребенок допускается в детское образовательное учреждение.

При отказе родителей от постановки пробы Манту через год (не вакцинированные против туберкулеза через 6 месяцев), процедура принятия решения о нахождении ребенка в организованном детском коллективе повторяется в вышеуказанном порядке.

2. По пункту 11.15. «Иммунизация против туберкулеза детей, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, проводится в родильном доме в том случае, если была проведена трехэтапная химиопрофилактика передачи ВИЧ от матери ребенку (три антиретровирусными препаратами в течение не менее 8 недель перед родами, во время родов и в периоде новорожденности)».

На территории Иркутской области крайне неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по заболеваемости туберкулезом, при этом ВИЧ-инфицированные лица являются основной группой риска. Более 30 % вновь выявленных случаев туберкулеза составляют пациенты с ВИЧ статусом. Показатель охвата беременных ВИЧ-инфицированных женщин трехэтапной химиопрофилактикой составляет менее 80 % (за 9 месяцев 2014 года – 77,9 %) и соответственно количество женщин, получавших химиопрофилактику во время родов 8 и более недель, еще меньше. Таким образом, почти 40 % новорожденных, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей, не будут вакцинированы в родильном доме против туберкулеза.

Учитывая изложенное, по согласованию с управлением Роспотребнадзора по Иркутской области, временно до получения разъяснений от Федеральной службы Роспотребнадзора, следует при назначении прививки БЦЖ-М новорожденному от ВИЧ-инфицированной матери руководствоваться только клиническим состоянием ребенка в соответствии с приказом главного управления здравоохранения Иркутской области от 03.07.2006 г. №698 «О БЦЖ вакцинации детей из перинатального контакта по ВИЧ».

Заместитель министра

Бойко

Т.В. Бойко

Исп: Ю.И. Лысанов
991-597



*Назначить прививку БЦЖ-М
моя пациентка по показаниям
рассмотреть.*